


- Front, ♂, id., ♀ au moins aussi large que la moitié de l'un des yeux ; pipette ; munie de lèvres bien distinctes ; 1^{re} nervure transversale ; sise au delà de l'extrémité de la 2^e longitudinale ; oviducte ; muni de crochets à son extrémité..... G. *Craspedochæta*.
(Macq., Dipt. exot., Suppl. IV, 1850.)
- 10'. Pipette ; acuminée, sans lèvres distinctes ; abdomen ; deux rangées transversales de macrochètes sur les segments ; organe ♂ ; peu développé..... G. *Acyglossa*.
(Rond., Atti Soc. ital. Sc. nat., IX, 1867.)
- Id. ; obtuse, lèvres bien distinctes ; macrochètes abdominaux et organe ♂ ; variables..... 11'.
- 14'. Deuxième nervure transversale ; peu ou point oblique ; organe ♂ ; épaissi, ou, muni de lobes saillants. G. *Parachortophila*.
(Pars *Chortophilæ* Rond.). Mihi.
- Id. ; fort oblique ; organe ♂ ; peu développé, inappendiculé..... G. *Hylephila*.
(Rond., Prodr., 1877, vol. VI.)



XXX

GENRE *Ctenostylum*.

Parmi les matériaux, relativement considérables, que j'eus autrefois la bonne fortune de communiquer à mon savant collègue Macquart, et à l'aide desquels il composa la majeure partie des derniers volumes (Suppléments) de son grand ouvrage, *Diptères exotiques nouveaux ou peu connus*, se trouvait un Diptère *incomplet* (c'est-à-dire, ayant l'abdomen mutilé), acquis avec d'autres des rives de l'Amazone, suivant l'indication des *paillettes* ; Macquart l'a dénommé *Ctenostylum rufum* (loc. cit.,

4^e Supplém., 1850, p. 167, tab. 25, fig. 1), et classé, *avec doute*, chez les *OEstridæ*.

Ce *type* excentrique figure encore dans ma collection : il présente à tous égards un grand intérêt, surtout en raison de sa conformation ambiguë.

En effet, l'atrophie apparente de ses *organes buccaux* semblerait le rapprocher desdites *OEstridæ*, tandis que la *pseudo-reticulation produite par les curicuses anastomoses de deux des nervures longitudinales externes*, tendrait à le faire assimiler aux *Nemestrinidæ*? Mais, l'*insertion manifestement dorsale d'un chète antennaire (villeux seulement en dessus)*, l'*absence d'Empodium*, l'*atrophie des cuillerons*, la *présence de sept nervures longitudinales seulement atteignant les bords de l'aile*, parmi lesquelles la *cinquième, non plus que les autres, ne sont coudées ni courbées en dehors*, me portent à penser qu'il serait mieux à sa place auprès des *Conopsidæ* ou des *Myopidæ*, dans une division nouvelle, créée exclusivement à son intention, et qu'on pourrait appeler : Tribu des *Ctenostilydæ*? On retrouve, il est vrai, chez lui, quelques-uns des traits propres aux *OEstridæ*, mais le *faciès* de ces derniers l'en éloigne absolument, de plus, ils possèdent tous des *cuillerons distincts*.

La description de Macquart est incomplète, sa figure l'est pareillement : entre autres défauts, son dessin ne rend pas convenablement l'aspect anormal des *nervures longitudinales extérieures précitées*.

C'est pourquoi je crois utile de compléter et de rectifier, comme il suit, le signalement de ce curieux insecte :

Ailes : la *troisième nervure longitudinale* s'anastomose avec la *costale* par l'intermédiaire de 7 ou 8 petites nervures transversales *épaisses*, formant ainsi 6 ou 7 cellules, dont la 1^{re} et les 4 dernières semblent *fénestrées* vers leur milieu ; ces *fénestrations* sont de forme ovale.

Thorax : une *forte et courte épine* légèrement recourbée, se montre de chaque côté à l'angle postérieur du mésothorax.

